

Procedimentos dentários pouco prováveis de causar hemorragia	Procedimentos dentários prováveis de causar hemorragia	
	Baixo risco de complicações hemorrágicas pós-operatórias	Alto risco de complicações hemorrágicas pós-operatórias
<p>Anestesia local infiltrativa, intraligamentar ou troncular</p> <p>Avaliação periodontal simples</p> <p>Remoção supragengival de placa, tártaro ou pigmentação</p> <p>Restaurações diretas ou indiretas com margens supragengivais</p> <p>Endodontia</p> <p>Impressões ou outros procedimentos protéticos</p> <p>Colocação de aparelhos ortodônticos</p>	<p>Extrações simples (1 a 3 dentes, com tamanho de ferida operatória reduzida, sem probabilidade de complicações cirúrgicas)</p> <p>Incisão e drenagem de abscessos intraorais</p> <p>Periodontograma detalhado</p> <p>Alisamentos radiculares</p> <p>Restaurações diretas ou indiretas com margens subgengivais</p>	<p>Extrações complexas (prováveis de ter complicações cirúrgicas), extrações adjacentes que causam uma ferida operatória grande ou mais de 3 extrações de uma vez</p> <p>Procedimentos que exijam abertura de retalho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrações cirúrgicas • Cirurgia periodontal • Cirurgia pré-protética • Cirurgia perirradicular • Alongamento coronário • Cirurgia para colocação e implantes <p>Gengivectomias</p> <p>Biopsias</p>