

INFEÇÕES FÚNGICAS DA PELE

LESÕES CUTÂNEAS VERMELHAS E ESCAMOSAS COM FORMA REDONDA OU OVAL E UMA BORDA NÍTIDA.^{1,2}



FATORES DE RISCO^{2,3}



Ambientes quentes e húmidos



Predisposição genética



Sudorese excessiva




Usar roupas justas e oclusivas



Diabetes



Pele seca




PREVENÇÃO²⁻⁴



Use roupas leves e largas




Evite contato próximo com outras pessoas



Evite compartilhar toalhas ou roupas




Mantenha a pele limpa e seca



INFEÇÃO FÚNGICA SUPERFICIAL DA PELE, CAUSADA POR MALASSEZIA FURFUR⁵⁻⁸

MANCHAS DESCOLORADAS (ROSA, CASTANHO, BRANCO), REDONDAS OU OVAIS NO TRONCO, ANTEBRAÇOS, PESCOÇO E FACE⁵⁻⁸




FATORES DE RISCO^{5,6}

 Ambientes quentes e húmidos

 Má nutrição

 Utilização de óleos

 Uso de contraceptivos orais

 Sudorese excessiva

 Condições de imunossupressão

PREVENÇÃO⁸

 Evitar ambientes quentes

 Utilizar roupa clara e respirável

 Evitar utilização de óleos

AFETA PRINCIPALMENTE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS⁵, NÃO PROVOCA COMICHÃO E NÃO É CONTAGIOSO



MNSRM



CREME COM
CLOTRIMAZOL

- **Infeções na pele causadas por dermatófitos**

Por ex: *Tinea manuum*, *Tinea corporum*, Dermatite fúngica da fralda por *Candida*

- Ideal para o tratamento de zonas **não pilosas** e **pouco extensas**



Eficácia e tolerabilidade do clotrimazol comprovadas há mais de 50 anos⁹



Abrange um amplo espectro de infeções fúngicas da pele¹⁰

PARA ÁREAS MAIS EXTENSAS E PILOSAS



SOLUÇÃO COM
BIFONAZOL



- Tratamento da Pitiríase versicolor
- Ideal para o tratamento de **áreas extensas, de difícil acesso e pilosas**
- Ação antifúngica



Eficácia de 100%¹¹



Mais fácil de incorporar na rotina diária

Nome: **Canesten Unidia**. **Composição:** 1 ml de solução para pulverização cutânea contém 10 mg de bifonazol. **Forma farmacêutica:** Solução para pulverização cutânea. **Indicações:** Tratamento tópico de micoses interdigitais (tinea pedis, tinea manuum) provocadas por fungos suscetíveis e pitiríase versicolor. **Posologia e modo de administração:** Para obter uma cura duradoura, o tratamento deve ser efetuado durante o período indicado. Micoses do pé, pé-de-atleta (Tinea pedis, tinea pedum interdigitalis): 3 semanas. Micoses das mãos (Tinea manuum): 2-3 semanas. Pitiríase versicolor: 2 semanas. Utilizar 1 vez por dia, de preferência à noite, antes de deitar, aplicando uma camada fina na área cutânea afetada e friccionando ligeiramente. Premir 1 ou 2 vezes o atomizador. **População pediátrica:** Não foram realizados estudos aprofundados em crianças. Uma revisão dos dados clínicos relatados não evidencia a possibilidade de ocorrência de efeitos nocivos em crianças. Em lactentes e em crianças pequenas, este medicamento só deverá ser utilizado sob vigilância médica. **Contraindicações:** Hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. **Advertências:** Doentes com antecedentes de reações de hipersensibilidade a outros antifúngicos imidazólicos (por ex., econazol, clotrimazol, miconazol) devem utilizar medicamentos contendo bifonazol com cautela. Doentes sob terapia de varfarina deverão ser monitorizados. Se os sintomas piorarem ou se persistirem para além do tempo sugerido de tratamento, poderá ser uma situação que requer tratamento por um médico. **Efeitos indesejáveis:** Dor local, edema periférico, hipersensibilidade/dermatite de contacto, sensação de queimadura cutânea, eritema, eczema, irritação cutânea e prurido, urticária, vesiculação, esfoliação cutânea, pele seca, maceração cutânea. Data da revisão do texto: 10/2022. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica não participado. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. Bayer Portugal Lda., Avenida Vítor Figueiredo nº4 - 4º piso, 2790-255 Carnaxide, NIF 500 043 256.

Nome: **Canesten creme**. **Composição:** 1 g de creme contém 10 mg de clotrimazol. **Forma Farmacêutica:** Creme. **Indicações terapêuticas:** Infecções fúngicas da pele causadas por dermatófitos nomeadamente as micoses interdigitais nas mãos e nos pés (p.ex. tinea manuum, tinea pedum conhecido por "pé-de-atleta"); Dermatite das fraldas e Pitiríase versicolor. **Posologia e modo de administração:** Deve ser aplicado em camada fina, friccionando ligeiramente. Para tratar uma área correspondente, à da palma da mão, é geralmente suficiente uma tira de creme (1/2 cm de comprimento) aplicada 2 - 3 vezes por dia. Na dermatite das fraldas, deverá ser aplicado na zona a tratar, em camada fina, 2 a 3 vezes ao dia. Duração do tratamento: Pitiríase versicolor 1 – 3 semanas; Micoses interdigitais 3 - 4 semanas; Dermatite das fraldas 1 semana (após este período, o tratamento poderá prosseguir quando indicado pelo médico). Nos casos de antecedentes de hipersensibilidade ao álcool cetosteárico é conveniente optar por uma formulação que não contenha aquele componente (solução para pulverização cutânea). Para assegurar uma cura completa, o tratamento deverá prosseguir, dependendo da indicação, de acordo com as indicações, mesmo se os sintomas desaparecerem. **Contraindicações:** Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes do medicamento. **Advertências e precauções especiais de utilização:** O álcool cetosteárico pode originar reações cutâneas locais (ex: dermatite de contacto). O álcool benzílico pode causar reações alérgicas e irritação local ligeira. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Não se conhecem. **Efeitos indesejáveis:** Doenças do sistema imunitário: reação alérgica (síncope, hipotensão, dispneia, urticária), afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos (bolhas, desconforto/dor, edema, eritema, irritação, descamação/esfoliação), prurido, erupção cutânea, ardor/queimadura. Número da A.I.M.: 9363507- bisnaga com 20 g. Titular da A.I.M.: Bayer Portugal Lda. Avenida Vítor Figueiredo nº4, 4º piso 2790-255 Carnaxide. Data de revisão do texto: outubro 2022. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica não participado. Para mais informações contactar o Titular da AIM.