

Bepanthere® Pomada



Assaduras do Desporto?

Alto teor lipídico
que forma uma
barreira protetora



**ASSADURAS
NAS PERNAS**



**ASSADURAS NAS
DOBRAS DA PELE**

Nome: Bepanthere **Composição:** 50 mg/g de dexpanthenol. Excipientes com efeito conhecido: Lanolina 250 mg; Álcool cetílico 18 mg; Álcool estearílico 12 mg. **Forma farmacêutica:** pomada. **Indicações terapêuticas:** nos cuidados da pele do bebé como barreira protetora contra a maceração provocada por fraldas e para a prevenção e tratamento da irritação, vermelhidão e eritema das fraldas; em mães que amamentam, para os cuidados dos seios na prevenção e tratamento de rágadas (feridas) e inflamações dos mamilos; na promoção da cicatrização e epitelização de cicatrizes recentes e feridas superficiais (ex: queimaduras ligeiras e escoriações); na cicatrização de lesões e irritações da pele (ex: após radioterapia, fototerapia ou exposição a luz ultravioleta), úlceras crónicas e de decúbito, enxertos de pele; na prevenção e tratamento da pele seca, irritada, áspera ou gretada; tratamento alternado com corticosteroides. **Posologia e modo de administração:** Uso cutâneo; Nos cuidados do bebé, como barreira protetora contra a maceração provocada por fraldas e para a prevenção e tratamento da irritação, vermelhidão e eritema da fralda: aplicar em cada mudança de fralda no rabinho e virilhas do bebé, depois de ter lavado estas zonas com água; em mães que amamentam, para prevenção e tratamento de rágadas e inflamações dos mamilos: aplicar nos mamilos após cada mamada; nas outras situações: aplicar 1 ou várias vezes por dia. **Contra-indicações:** Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. **Advertências e precauções especiais de utilização:** precaução na utilização em doentes com hemofilia e obstrução intestinal mecânica, uma vez que em caso de absorção sistémica podem ocorrer um aumento dos tempos de coagulação e estimulação do trato gastrointestinal. Evitar o contacto com os olhos; Alguns excipientes de Bepanthere pomada podem reduzir a eficácia de produtos à base de látex, tais como preservativos e diafragmas; O álcool cetílico, o álcool estearílico e a lanolina podem causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto). **Efeitos indesejáveis:** reações alérgicas cutâneas em casos muito raros. **Titular da A.I.M.:** Bayer Portugal, Lda. **Data da revisão do texto:** 03/2024. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica não participado. Para mais informações contactar o Titular da AIM. Bayer Portugal Lda. Avenida Vítor Figueiredo nº4 - 4º piso 2790-255 Carnaxide. CH-20241031-59